

# Op weg naar IMO2011

## IMO2003 – OPGAVE 1



[ Esther Bod ]

Van 13 t/m 24 juli 2011 vindt voor het eerst in de geschiedenis in Nederland de Internationale Wiskunde Olympiade (International Mathematical Olympiad, IMO) plaats. Zo'n 600 leerlingen uit meer dan 100 landen zullen dan twee dagen lang in Amsterdam hun tanden zitten in een zestal zeer pittige wiskundeopgaven. Opgaven waaraan ook beroepswiskundigen vaak nog een flinke kluit hebben. Hoe zien die opgaven er eigenlijk uit? En wat trekt de deelnemers hierin zo aan? Om dat te ontdekken treft u in de komende nummers van *Euclides* elke keer een IMO-opgave uit het verleden aan, besproken door een leerling die indertijd in het Nederlandse team zat.

In 2002 en 2003 heb ik deelgenomen aan de Internationale Wiskunde Olympiade. Mijn eerste deelname, in Glasgow, was een erg leuke en bijzondere ervaring, maar ondanks een goede voorbereiding bleek het niveau van de opgaven voor mij iets te hoog gegrepen. Na een leerzame en gezellige training mocht ik in 2003 opnieuw meedoen. Deze keer ging de reis helemaal naar Tokio, wat het natuurlijk extra leuk maakte. Ik was vastbesloten meer punten te halen dan het jaar ervoor, en misschien zelfs een eervolle vermelding voor een volledig correct opgeloste opgave. De olympiade begon met een opgave die me wel leek te liggen.

### De opgave

Laat  $S$  de verzameling  $\{1, 2, \dots, 1\,000\,000\}$  zijn, en laat  $A$  een deelverzameling van  $S$  zijn met precies 101 elementen. Bewijs dat er in  $S$  getallen  $t_1, t_2, \dots, t_{100}$  bestaan zodat de verzamelingen  $A_j = \{t_j + a \mid a \in A\}$  voor  $j = 1, 2, \dots, 100$  onderling disjunct zijn.

Ter herinnering, verzamelingen zijn disjunct als geen enkel getal in twee of meer van die verzamelingen voorkomt. We kunnen ons  $A_j$  voorstellen als een kopie van  $A$ , maar dan 'verschoven' over  $t_j$ . We moeten dus 100 van zulke verschoven kopieën van  $A$  vinden, zodat ieder getal in hoogstens één kopie ligt.

### Voorbeeld 1

We bekijken eerst een klein voorbeeld. Dat helpt vaak om meer inzicht te krijgen in de opgave, en om een idee voor de aanpak van het algemene probleem op te doen. In plaats van een verzameling  $S$  met 1 000 000 elementen gaan we voor  $S$  uit van een verzameling met 10 elementen:

$S = \{1, 2, \dots, 10\}$ . Voor  $A$  gaan we uit van een verzameling met 4 elementen:  $A = \{2, 4, 6, 8\}$ . De verzameling  $A_j$  bestaat dan uit  $t_j + 2, t_j + 4, t_j + 6$  en  $t_j + 8$ . Laten we gewoon proberen een aantal  $t_j$ 's te kiezen, en kijken hoeveel we er kunnen vinden zodat de verzamelingen  $A_j$  disjunct zijn. Om te beginnen kiezen we  $t_1 = 1$ . Dan is  $A_1 = \{3, 5, 7, 9\}$ . We willen dat  $A_2$  geen elementen hiermee gemeenschappelijk heeft. Dat gaat zeker goed als  $A_2$  alleen grote getallen bevat. Daarom kiezen we  $t_2$  zo groot mogelijk:  $t_2 = 10$ . Dan krijgen we  $A_2 = \{12, 14, 16, 18\}$ .

Voor  $t_3$  proberen we gewoon de kleinste mogelijkheid:  $t_3 = 2$ . Dan is  $A_3 = \{4, 6, 8, 10\}$ . Dit mag, want  $A_3$  is nu disjunct met zowel  $A_1$  als  $A_2$ .

Wat kunnen we nu nog kiezen voor  $t_4$ ? Als we  $t_4 = 3$  kiezen, is  $A_4 = \{5, 7, 9, 11\}$ ; dus dan zijn  $A_1$  en  $A_4$  niet disjunct. Hetzelfde geldt voor  $t_4 = 5$  en  $t_4 = 7$ . Als we  $t_4 = 4$ ,  $t_4 = 6$  of  $t_4 = 8$  kiezen, zijn  $A_3$  en  $A_4$  niet disjunct. We kunnen wel  $t_4 = 9$  kiezen:  $A_4 = \{11, 13, 15, 17\}$  is disjunct met  $A_1, A_2$  en  $A_3$ . Iedere keuze voor  $t_5$  levert nu een verzameling op die niet disjunct is met  $A_1, A_2, A_3$  of  $A_4$ .

### Voorbeeld 2

We bekijken nog een ander voorbeeld:  $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$  en  $A = \{1, 2, 4\}$ . We kiezen  $t_1$  willekeurig:  $t_1 = 3$ . Dan is  $A_1 = \{4, 5, 7\}$ . Nu proberen we  $t_2$  zo te kiezen, dat  $A_1$  en  $A_2$  disjunct zijn. Als we  $t_2 = 1$  kiezen, krijgen we  $A_2 = \{2, 3, 5\}$ . Nu zijn  $A_1$  en  $A_2$  niet disjunct, omdat ze allebei 5 bevatten. We mogen ook niet  $t_2 = 2$  kiezen, want dan is  $A_2 = \{3, 4, 6\}$  en bevatten zowel  $A_1$  als  $A_2$  het getal 4. Als we  $t_2 = 4$  kiezen, komt 5 in zowel  $A_1$  als  $A_2$  voor. Met  $t_2 = 5$  komt 7 in zowel  $A_1$  als  $A_2$  voor. De getallen uit  $S$  mogen dus allemaal niet meer!

Waarom kunnen we in dit voorbeeld geen  $t_2$  vinden, terwijl we in het vorige voorbeeld maar liefst  $t_1$  tot en met  $t_4$  konden vinden zodat de verzamelingen  $A_j$  disjunct zijn? We moeten  $t_2$  zo kiezen dat  $t_2 + 1, t_2 + 2$  en  $t_2 + 4$  niet gelijk zijn aan 4, 5 en 7, dus aan  $3 + 1, 3 + 2$  en  $3 + 4$ . Anders gezegd, er mogen geen getallen  $a$  en  $b$  in  $A$  bestaan zodat  $t_2 + a = 3 + b$ . Dat betekent dat  $t_2$  niet gelijk mag zijn aan  $b - a + 3$ , voor alle  $a$  en  $b$  in  $A$ . Als we alle mogelijke  $a$  en  $b$  proberen, zien we dat  $b - a + 3$  een getal tussen 0 en 6 is (inclusief 0 en 6). Omdat alle getallen uit  $S$  al in dit rijtje voorkomen, kunnen we geen  $t_2$  meer kiezen. Dat kunnen we ook zien in **tabel 1**, waarin alle waarden staan die  $b - a$  aanneemt, en alle waarden van  $b - a + 3$ . Hierin komen alle getallen uit  $S$  voor, dus kunnen we geen  $t_2$  kiezen.

$a$	$b$		
	1	2	4
1	0	1	3
2	-1	0	2
4	-3	-2	0

$a$	$b$		
	1	2	4
1	3	4	6
2	2	3	5
4	0	1	3

tabel 1 Bij voorbeeld 2  
links: de waarden die  $b - a$  aanneemt,  
rechts: de waarden die  $b - a + 3$  aanneemt

In het eerste voorbeeld mocht  $t_2$  niet gelijk zijn aan  $b - a + 1$ . In dit geval was  $b - a$  altijd een even getal, namelijk 0,  $\pm 2$ ,  $\pm 4$  of  $\pm 6$ . Daarom was  $b - a + 1$  altijd oneven, dus voor  $t_2$  konden we elk even getal uit  $S$  kiezen. Er zijn zelfs nog meer mogelijkheden: 9 mocht ook. Het bijzondere aan deze verzameling  $A$  is dat  $b - a$  weinig verschillende waarden aanneemt: de opeenvolgende getallen verschillen altijd 2, dus 2 komt meerdere malen voor als verschil. Hetzelfde geldt voor  $-4, -2, 0$  en 4. Dat zien we ook als we weer een tabel maken met alle mogelijke waarden van  $b - a$  en  $b - a + 1$ ; zie **tabel 2**.

$a$	$b$			
	2	4	6	8
2	0	2	4	6
4	-2	0	2	4
6	-4	-2	0	2
8	-6	-4	-2	0

$a$	$b$			
	2	4	6	8
2	1	3	5	7
4	-1	1	3	5
6	-3	-1	1	3
8	-5	-3	-1	1

tabel 2 Bij voorbeeld 1  
links: de waarden die  $b - a$  aanneemt,  
rechts: de waarden die  $b - a + 1$  aanneemt

## Oplossing

Laten we nu proberen om de opgave op te lossen. Van de voorbeelden hebben we geleerd dat het aantal getallen dat het verschil is tussen twee getallen uit  $A$  belangrijk is. In het eerste voorbeeld waren er niet veel mogelijkheden voor het verschil van de getallen uit  $A$ . Daarom konden we daar meer  $t_j$ 's vinden zodat de verzamelingen  $A_j$  disjunct zijn, dan in het tweede voorbeeld, waarin er veel meer mogelijkheden waren voor het verschil van de getallen uit  $A$ . Nu is  $A$  een gegeven, vaste verzameling, dus we kunnen er niet voor zorgen dat het aantal verschillen klein is. We moeten er dus rekening mee houden dat  $A$  heel ongunstig kan zijn.

Laten we de elementen van  $A$  een naam geven:  $A = \{a_1, a_2, \dots, a_{101}\}$ . De verzameling  $A_j$  bestaat dan uit de getallen  $t_j + a_1, t_j + a_2, \dots, t_j + a_{101}$ . Nu gaan we  $t_1, t_2, \dots, t_{100}$  proberen te kiezen, zodat ieder nieuw getal  $t_j$  een verzameling  $A_j$  geeft die disjunct is met  $A_1, \dots, A_{j-1}$ . Het idee is dat we gaan afschatten hoeveel getallen we niet meer als  $t_j$  mogen kiezen. Als er nog ten minste één mogelijkheid is voor  $t_j$  die wel mag (dus zodat  $A_j$  disjunct is met  $A_1, \dots, A_{j-1}$ ), dan kunnen we nog een  $t_j$  kiezen. We zouden kunnen proberen om de getallen slim te kiezen, zodat er nog veel mogelijkheden over zijn. Dat is echter moeilijk omdat we niets over  $A$  weten. Daarom kiezen we  $t_j$  willekeurig uit alle mogelijkheden die een  $A_j$  geven die disjunct is met de rest van de verzamelingen.

Voor  $t_1$  kunnen we een willekeurig element van  $S$  kiezen. Nu willen we  $t_2$  zo kiezen, dat er geen  $a_i$  en  $a_j$  zijn zodat  $a_i + t_2 = a_j + t_1$ ; dus  $t_2$  mag niet gelijk zijn aan  $a_j - a_i + t_1$ . We weten natuurlijk niet welke waarden  $a_j - a_i + t_1$  aanneemt, maar dat is ook niet nodig: we hoeven alleen te weten hoeveel mogelijkheden voor  $t_2$  we overhouden. Omdat  $A$  precies 101 elementen heeft, zijn er in totaal  $101^2 = 10201$  mogelijke tweetallen  $(a_i, a_j)$  en dus hoogstens 10201 mogelijkheden voor  $a_j - a_i$ . Als we  $t_1$  gekozen hebben, is  $t_1$  een vast getal en zijn er dus ook hoogstens 10201 mogelijkheden voor  $a_j - a_i + t_1$ . We mogen  $t_2$  niet gelijk aan een van deze (hoogstens) 10201 getallen kiezen (waarvan een aantal mogelijk niet eens in  $S$  liggen), maar dan zijn er nog minstens  $1000000 - 10201 = 989799$  mogelijkheden voor  $t_2$  in  $S$  over. We kiezen  $t_2$  gelijk aan een van deze

minstens 989799 getallen, en proberen nu een  $t_3$  te kiezen. Er mogen geen  $a_i$  en  $a_j$  zijn zodat  $a_i + t_3 = a_j + t_1$  of  $a_i + t_3 = a_j + t_2$ . Dat betekent dat  $t_3$  niet gelijk mag zijn aan  $a_j - a_i + t_1$ , en ook niet gelijk aan  $a_j - a_i + t_2$ . Daarom mogen er hoogstens  $2 \cdot 10201 = 20402$  getallen niet voor  $t_3$ ; dus er zijn nog minstens 979598 mogelijkheden over. Nu proberen we dit ook te doen voor  $t_4, t_5, \dots, t_{100}$ . Als we  $t_1, \dots, t_{k-1}$  al gekozen hebben, moeten we  $t_k$  zo kiezen, dat er geen  $a_i$  en  $a_j$  in  $A$  en  $t_l$  (met  $l < k$ ) zijn zodat  $a_i + t_k = a_j + t_l$ . Daarom mag  $t_k$  niet gelijk zijn aan  $a_j - a_i + t_l$ . Voor iedere  $l$  neemt dit hoogstens 10201 waarden aan, en  $l$  loopt van 1 tot  $k-1$ ; dus in totaal zijn er hoogstens  $10201(k-1)$  getallen waaraan  $t_k$  niet gelijk mag zijn. Zolang  $10201(k-1)$  kleiner is dan 1000000, kunnen we dus een  $t_k$  kiezen. Het aantal mogelijkheden is natuurlijk het kleinst voor  $k = 100$ . Hiervoor mogen we  $10201 \cdot 99 = 1009899$  getallen niet kiezen. Maar er zijn maar 1000000 getallen om uit te kiezen! Deze methode werkt dus niet helemaal: we moeten iets scherper schatten hoeveel getallen we niet meer mogen kiezen voor  $t_k$ .

Laten we nog eens kijken naar het aantal waarden dat  $a_j - a_i$  kan aannemen. We hebben dit afgeschat op  $101^2$ . Echter, als  $i = j$  is  $a_j - a_i = 0$ . Eigenlijk zijn er dus minder mogelijkheden voor  $a_j - a_i$ ; er zijn hoogstens  $101 \cdot 100 = 10100$  mogelijkheden met  $i \neq j$ , en één mogelijkheid met  $i = j$ . In de tabellen bij de voorbeelden kunnen we dit ook al zien: op de diagonaal staan alleen nullen. In totaal neemt  $a_j - a_i$  dus hoogstens 10101 waarden aan. Als we hiermee bovenstaande methode om  $t_2, t_3, \dots, t_{100}$  te kiezen herhalen, dan zien we dat er hoogstens  $10101(k-1)$  getallen zijn waaraan  $t_k$  niet gelijk mag zijn. Als we nu  $k = 100$  nemen, zijn er hoogstens 999999 getallen die we niet mogen kiezen als  $t_{100}$ . Er is dus nog één mogelijkheid voor  $t_{100}$  over! Zelfs als we de getallen willekeurig kiezen, kunnen we dus nog een  $t_{100}$  kiezen. We kunnen de getallen  $t_1, \dots, t_{100}$  dus kiezen door steeds een willekeurig getal te nemen zodat  $A_j$  disjunct is met  $A_1, \dots, A_{j-1}$ . Omdat we hebben laten zien dat er steeds nog zo'n getal bestaat, is het bewijs afgerond: we kunnen inderdaad getallen  $t_1, t_2, \dots, t_{100}$  kiezen zodat de verzamelingen  $A_1, A_2, \dots, A_{100}$  disjunct zijn.

## Tot slot

En mijn hoop om een goede score te halen? Ik dacht dat ik deze opgave goed had en hoopte nog een punt voor opgave 2 te hebben; dus was ik tevreden over de eerste dag. Helaas bleek ik een foutje te hebben gemaakt in opgave 1: als ik het me goed herinner, was ik vergeten om het verschil  $a_j - a_i = 0$  mee te tellen, zodat ik maar 10100 mogelijkheden voor  $a_j - a_i + t_l$  had geteld. De tweede dag leverde maar 1 extra punt op, zodat mijn score tegenviel. Door de training wist ik wel beter hoe je zulke opgaven aan kunt pakken. Dat leverde niet alleen punten op bij de olympiade, maar is ook tijdens mijn studie goed van pas gekomen. Bovenal is de olympiade een mooie uitdaging voor leerlingen met interesse in wiskunde. Voor mij was het een heel leuke ervaring om intensief en op hoog niveau met wiskunde bezig te zijn en andere leerlingen van over de hele wereld met dezelfde interesse te ontmoeten.

## Info

Website IMO2011: [www.imo2011.nl](http://www.imo2011.nl)

Zie ook:

- Quintijn Puite (2010): *Van Bijsterveldt lanceert IMO2011*. In: *Euclides* 85(5), p. 209.
- Birgit van Dalen (2010): *Op weg naar IMO2011 / IMO2002 - Opgave 1*. In *Euclides* 85(5), pp. 210-211.

## Over de auteur

Esther Bod heeft in 2002 en 2003 deelgenomen aan de *Internationale Wiskunde Olympiade* en in 2006 en 2007 aan de *International Mathematics Competition for University Students*. Daarnaast is ze als deelnemer en organisator betrokken geweest bij de *Landelijk Interuniversitaire Mathematische Olympiade*. Ze werkt als promovendus aan het Mathematisch Instituut van de Universiteit Utrecht. E-mailadres: [E.Bod@uu.nl](mailto:E.Bod@uu.nl)